

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA - REGIONE BASILICATA – 2018

ALLEGATO A

MODIFICHE al Disciplinare di produzione Integrata Regione Basilicata - APRILE 2018 -

Inserimenti e/o modifiche

Coltura	Avversità	Sostanza attiva	Decisione
FRUTTICOLE E VITE			
Arancio e mandarino	acari: <i>Panonychus ulmi</i> e <i>Tetranychus urticae</i>	acequinocyl	inserire
Agrumi	afide verde degli agrumi (<i>Aphis spiraecola</i>), afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>), afide marrone degli agrumi (<i>Aphis citricidus</i>), afide del cotone e delle cucurbitacee (<i>Toxoptera aurantii</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Agrumi	cocciniglia bianca-rossa forte degli agrumi (<i>Aonidiella aurantii</i>), cocciniglia farinosa degli agrumi (<i>Planococcus citri</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Ciliegio	afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>), afide nero del ciliegio (<i>Myzus cerasi</i>), afide farinoso del susino (<i>Hyalopterus pruni</i>), afide verdastro piccolo del susino (<i>Brachycaudus helichrysi</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Ciliegio	cocciniglia bianca del pesco (<i>Pseudalacaspis pentagona</i>), cocciniglia di San Jose (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Pesco	afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>), afide nero del ciliegio (<i>Myzus cerasi</i>), afide farinoso del susino (<i>Hyalopterus pruni</i>), afide verdastro piccolo del susino (<i>Brachycaudus helichrysi</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Pesco	cocciniglia bianca del pesco (<i>Pseudalacaspis pentagona</i>), cocciniglia di San Jose (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Fragola	Oidio (<i>Podosphaera macularis</i>)	ciflufenamid + difenconazolo	inserire max 2 trattamenti nell'ambito del gruppo dei CS
Fragola	Alternaria (<i>Alternaria</i> sp.)	ciflufenamid + difenconazolo	inserire max 2 trattamenti nell'ambito del gruppo dei CS
Fragola	Micosferella (<i>Mycosphaerella fragariae</i>)	ciflufenamid + difenconazolo	inserire max 2 trattamenti nell'ambito del gruppo dei CS
Fragola	oidio	flutriafol	inserire nei limiti degli IBE
Fragola cp	spodoptora	spinosad	inserire
Fragola	drosophila	lambda-cialotrina	inserire max 1 trattamento nei limiti dei piretroidi
Lampone	drosophila	lambda-cialotrina	inserire max 1 trattamento nei limiti dei piretroidi
Melo	ticchiolatura	fosfonato di potassio	inserire max 6 trattamenti all'anno
Melo	psille	piretrine pure	inserire solo nei disciplinari di Province autonome e Regioni interessate dall'avversità
Melo	afide verde del melo (<i>Aphis pomi</i>), afide grigio del melo (<i>Dysaphis plantaginea</i>), afide lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Melo	cocciniglia di San Jose (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Pero	afide verde del melo (<i>Aphis pomi</i>), afide grigio del melo (<i>Dysaphis plantaginea</i>), afide lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Pero	cocciniglia di San Jose (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Pero	ticchiolatura	fosfonato di potassio	inserire max 6 trattamenti all'anno
Olivo	Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>)	dimetoato	inserire nei limiti della s.a.
Vite	peronospora	oxathiapiprolin	inserire max 2 trattamenti
Vite da Tavola	fitoregolatore: facilita la cascola degli acini partenocarpici agevolando il controllo dell'acinellatura	metamitron	inserire

MODIFICHE al Disciplinare di produzione Integrata Regione Basilicata - APRILE 2018 -

DISERBO			
Agrumi	diserbo - graminicidi	propaquizafop	inserire
Albicocco	diserbo - graminicidi	propaquizafop	inserire
Ciliegio	diserbo - graminicidi	propaquizafop	inserire
Mandorlo	diserbo - graminicidi	propaquizafop	inserire
Melo	diserbo - graminicidi	propaquizafop	inserire
Nocciolo	diserbo - graminicidi	propaquizafop	inserire
Noce	diserbo - graminicidi	propaquizafop	inserire
Pero	diserbo - graminicidi	propaquizafop	inserire
Pesco	diserbo - graminicidi	propaquizafop	inserire
Susino	diserbo - graminicidi	propaquizafop	inserire
Vite	diserbo - graminicidi	propaquizafop	inserire
Olivo	post-emergenza delle infestanti a foglia larga in autunno o fine inverno-inizio primavera	Tribenuron metile	inserire
Actinidia comprese piante non in produzione	diserbo pre-emergenza	Isoxaben + oryzalin	inserire
Albicocco, comprese piante non in produzione	diserbo pre-emergenza	Isoxaben + oryzalin	inserire
Ciliegio, comprese piante non in produzione	diserbo pre-emergenza	Isoxaben + oryzalin	inserire
Mandorlo	diserbo pre-emergenza	Isoxaben + oryzalin	inserire
Melo, comprese piante non in produzione	diserbo pre-emergenza	Isoxaben + oryzalin	inserire
Nocciolo	diserbo pre-emergenza	Isoxaben + oryzalin	inserire
Noce	diserbo pre-emergenza	Isoxaben + oryzalin	inserire
Pero, comprese piante non in produzione	diserbo pre-emergenza	Isoxaben + oryzalin	inserire
Pesco, comprese piante non in produzione	diserbo pre-emergenza	Isoxaben + oryzalin	inserire
Susino, comprese piante non in produzione	diserbo pre-emergenza	Isoxaben + oryzalin	inserire
vite comprese piante non in produzione	diserbo pre-emergenza	Isoxaben + oryzalin	inserire
vite in produzione oltre il terzo anno	diserbo pre-emergenza	penoxulam	inserire

4

MODIFICHE al Disciplinare di produzione Integrata Regione Basilicata - APRILE 2018 -

ORTICOLE			
prezzemolo	marciumi e peonospora	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	inserire
prezzemolo	peronospora	dimetomorf	inserire nei limiti dei CAA
Cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, cavoli verza, cavoli di Bruxelles, cavolo, cinese, cime di rapa - pieno campo	afide ceroso del cavolfiore (<i>Brevicoryne brassicae</i>), afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
cavoli di Bruxelles	afidi, nottue, tignola delle crucifere	azadiractina	inserire
cavoli di Bruxelles	afidi	tau-fluvalinate	inserire
Cicoria, indivia, radicchio e scarola (in pieno campo)	nottue	tebufenozide	inserire
Lattughe pc	peronospora	oxathiapiprolin	inserire pc max 3 per anno e max 2 per ciclo
Lattughe e altre insalate (in pieno campo)	nottue	tebufenozide	inserire in alternativa al metoxifenozide
Lattughe	afide della lattuga (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
indivia riccia, scarola, radicchio	nottue e miridi	etofenprox	modificare nota da: max 2 trattamenti/cicli in: max 2 trattamenti/anno
cicoria, indivia, radicchio e scarola, lattuga e rucola (in serra)	sclerotinia	azoxystrobin	inserire in serra su bremia, su sclerotinia sia in serra che pieno campo con i limiti delle strobilurine
Peperone cp	nottue	tebufenozide	inserire in alternativa al metoxifenozide su nottue; inserire su tuta assoluta; max 2 interventi indipendentemente
Peperone cp	tuta assoluta	tebufenozide	inserire in alternativa al metoxifenozide su nottue; inserire su tuta assoluta; max 2 interventi indipendentemente dall'avversità
Peperone cp	acari	pyridaben	inserire
Peperone cp	<i>Ostrinia nubilalis</i> (piralide del mais)	Feromone per la lotta con il metodo della confusione sessuale	inserire
Pomodoro	afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>), afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>), afidone verde della patata (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Pomodoro	aleurodide delle serre (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), aleurodide del tabacco (<i>Bemisia tabaci</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Peperone	afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>), afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>), afidone verde della patata (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Peperone	aleurodide delle serre (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), aleurodide del tabacco (<i>Bemisia tabaci</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Melanzana	afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>), afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>), afidone verde della patata (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Melanzana	aleurodide delle serre (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), aleurodide del tabacco (<i>Bemisia tabaci</i>)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Pomodoro pc e cp	peronospora	oxathiapiprolin	inserire pc max 3
Pomodoro cp	peronospora	amisulbrom	inserire max 3 trattamenti fra amisulbrom e cyazofamide
Pomodoro (in coltura protetta)	nottue	tebufenozide	inserire in alternativa al metoxifenozide su nottue; inserire su tuta assoluta; max 2 interventi indipendentemente dall'avversità

62

MODIFICHE al Disciplinare di produzione Integrata Regione Basilicata - APRILE 2018 -

Pomodoro (in coltura protetta)	Tuta assoluta	tebufenozide	inserire in alternativa al metoxifenozide su tute; inserire su tuta assoluta; max 2 interventi indipendentemente dall'avversità
prezzemolo	nottue	deltametrina	inserire nota: ammessa solo in pieno campo
Spinacio	afidi	sulfoxaflor	inserire in alternativa all'acetamiprid max 2 trattamenti
Rucola	nottue	etofenprox	modificare nota da: max 1 trattamento/taglio in: max 2 trattamenti/anno
Rucola	tripidi	etofenprox	modificare nota da: max 1 trattamento/taglio in: max 2 trattamenti/anno
Rucola	miridi	etofenprox	modificare nota da: max 1 trattamento/taglio in: max 2 trattamenti/anno
Rucola	nottue	tebufenozide	inserire in alternativa al metoxifenozide
Zucchine in pieno campo e serra	afide delle cucurbitacee (Aphis gossypii), afide verde del pesco (Myzus persicae), afide del ramno (Aphis nasturtii), afide nero della fava (Aphis fabae)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Zucchine in pieno campo e serra	aleurodide delle serre (Trialeurodes vaporariorum) e aleurodide del tabacco (Bemisia tabaci)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Meloni in pieno campo e serra	Afide delle cucurbitacee (Aphis gossypii), afide verde del pesco (Myzus persicae), afide del ramno (Aphis nasturtii), afide nero della fava (Aphis fabae)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Meloni in pieno campo e serra	Aleurodide delle serre (Trialeurodes vaporariorum) e aleurodide del tabacco (Bemisia tabaci)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Angurie in pieno campo e serra	Afide delle cucurbitacee (Aphis gossypii), afide verde del pesco (Myzus persicae), afide del ramno (Aphis nasturtii), afide nero della fava (Aphis fabae)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Angurie in pieno campo e serra	Aleurodide delle serre (Trialeurodes vaporariorum) e aleurodide del tabacco (Bemisia tabaci)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi

4

MODIFICHE al Disciplinare di produzione Integrata Regione Basilicata - APRILE 2018 -

ERBACEE			
Frumento	septoria	Bixafen+Protioconazolo	
DISERBO ORTICOLE			
Asparago	diserbo post-raccolta, prima emissione della vegetazione estiva (pre-ricaccio)	metribuzin	inserire
Asparago	diserbo pre-emergenza, applicabile in pre-ricaccio o dopo la raccolta	Isoxaben + oryzalin	inserire max 1 trattamento/anno solo sul 75% della superficie in pre-emergenza
asparago	diserbo	piridate	correggere il target sulle infestanti: eliminare le graminacee e inserire in base alle indicazioni di etichetta (post-emergenza/trapianto)
cavoli ad infiorescenza, cavolo rapa	diserbo	piridate	correggere il target sulle infestanti: eliminare le graminacee e inserire in base alle indicazioni di etichetta (post-emergenza/trapianto)
cece	diserbo	piridate	correggere il target sulle infestanti: eliminare le graminacee e inserire in base alle indicazioni di etichetta (post-emergenza/trapianto)
fagiolo	diserbo	piridate	correggere il target sulle infestanti: eliminare le graminacee e inserire in base alle indicazioni di etichetta (post-emergenza/trapianto)
pisello	diserbo	piridate	correggere il target sulle infestanti: eliminare le graminacee e inserire in base alle indicazioni di etichetta (post-emergenza/trapianto)
Cavolfiore	diserbo post-emergenza graminacee	propaquizafop	inserire 1 solo trattamento all'anno
Cece	diserbo pre-emergenza	metribuzin	inserire
Cece	diserbo post-emergenza graminacee	propaquizafop	inserire 1 solo trattamento all'anno
Fava	diserbo pre-emergenza	metribuzin	inserire
Fava	diserbo post-emergenza graminacee	propaquizafop	inserire 1 solo trattamento all'anno
Finocchio trapiantato	diserbo post-trapianto	metribuzin	inserire
Finocchio	diserbo post-emergenza graminacee	propaquizafop	inserire
Melanzana	diserbo post-emergenza graminacee	propaquizafop	inserire 1 solo trattamento all'anno
orticole sulle quali è previsto il diserbo chimico	diserbo	acido pelargonico	inserire
Pisello	diserbo pre-emergenza	metribuzin	inserire
DISERBO ERBACEE			
colza	altica, meligete	acetamiprid	escludere
orzo	diserbo di post-emergenza dicotiledoni e graminacee	diflufenican + florasulam + iodosulfuron + cloquintocet mexil (antidoto)	inserire
Mais	diserbo in post emergenza	piridate	inserire
Sorgo	diserbo in post emergenza	fluroxipir	inserire

MODIFICHE al Disciplinare di produzione Integrata Regione Basilicata - APRILE 2018 -

ESCLUSIONI

Coltura	Avversità	Sostanza attiva	Decisione
ORTICOLE			
cavoli a testa	peronospora	propamocarb	escludere
cavoli a testa	nottue	lambdacialotrina + clorantraniliprole	escludere
indivia riccia, scarola, radicchio	nottue	lambdacialotrina + clorantraniliprole	escludere
lattuga	peronospora	benalaxyl	escludere
DISERBO			
Carciofo	diserbo post-emergenza	propaquizafop	escludere
Cicoria, indivia riccia e scarola	diserbo post-emergenza	propaquizafop	escludere
Pomodoro pc	diserbo pre-emergenza	metribuzin	escludere dal diserbo pre-emergenza
Rucola	diserbo post-emergenza	propaquizafop	escludere
Rucola	diserbo	quizalofop p etile	escludere
ERBACEE			
colza	altica, meligete	acetamiprid	escludere